


รู้จักกับ

ชิกุนคุนยา

โรคที่มาพร้อมกับยุงลาย




“โรคชิกุนคุนยา” (Chikungunya) หรือ “โรคไขปวดข้อยุงลาย” เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่ง ยุงลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ในทุกกลุ่มอายุ รวมทั้งเด็กเล็ก มีอาการคล้ายกับโรคไข้เลือดออกแต่ไม่รุนแรงเท่า โรคชิกุนคุนยามักไม่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต แต่ผู้เจ็บป่วยบางรายอาจมีอาการปวดข้อเรื้อรังต่อเนื่อง

อาการ



ไข้สูง
อย่างฉับพลัน



ผื่นแดง
ตาแดง
อาจมีอาการคันตามผิวหนัง



ปวดข้อ
เช่น นิ้วมือ นิ้วเท้า ข้อศอก



ในรายที่รุนแรง
อาจพบเกล็ดเลือดต่ำ
และมีอาการช็อกได้
แต่
“พบได้น้อยมาก”



อาการ
ปวดข้อช่วงแรก
มักหายได้
ภายใน
1-2 สัปดาห์

การรักษา

- รักษาตามอาการของโรค ไม่มีการรักษาที่จำเพาะเจาะจง
- เพทย์อาจให้ยากแก้ปวด หรือยาในกลุ่มต้านอักเสบในผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อ
- ควรดื่มน้ำพาราเซตามอล เพื่อลดไข้และอาการปวด
- เช็ดตัวด้วยน้ำสะอาด เพื่อช่วยลดไข้
- ดื่มน้ำและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ


โรคชิกุนคุนยา

vs

โรคไข้เลือดออก

อาการต่างกันอย่างไร ?

- ไข้สูงอย่างฉับพลัน
- ผื่นแดง ตาแดง อาจมีอาการคันตามผิวหนัง
- ปวดข้อ เช่น นิ้วมือ นิ้วเท้า ข้อศอก
- อาจมีเกล็ดเลือดต่ำ แต่พบได้น้อย
- พบแพทย์
รักษาตามอาการ
พักผ่อนให้เพียงพอ



- ไข้สูงลอย
- ผื่นแดงจำนวนมาก
- ปวดกล้ามเนื้อ
มากกว่าปวดข้อ
- เกล็ดเลือดต่ำ มีเลือดออก
- ควรพบแพทย์ทันที

ภาพแสดงการป้องกันยุงลาย
ภาพแพทย์ด้านกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
จากภาพแสดงวิธีป้องกันโรคชีกุนคุนยา



โรงพยาบาลราชวิถี



02 206 2900
<https://www.rama.go.th>

มูลนิธิรามาธิบดี
ภาพประกอบ: ชื่นพันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ 16-08-66

โรคซิคุนคุนยา VS โรคไข้เลือดออก 'เช็กให้ชัวร์' ต่างกันอย่างไร?

ซิคุนคุนยา

ไข้สูงอย่างเฉียบพลัน

ตาแดง มีผื่นแดง

ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ

ไม่มีเกล็ดเลือดต่ำจนเลือดออก

รักษาตามอาการ
พักผ่อนให้เพียงพอ

ไข้เลือดออก

ไข้สูงลอย

ผื่นแดงจำนวนมาก

ปวดเมื่อยน้อยกว่า

เกล็ดเลือดต่ำ มีเลือดออก

รับพบแพทย์ทันที ถ้ามีอาการ



โรงพยาบาลศิริราช
Siriraj Hospital



1728
www.siriraj.com



Follow Siriraj
@Sirirajhospital